

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации Кравченко Елены Николаевны на тему:

«Совершенствование методов диагностики нейросифилиса на основе определения в ликворе маркеров поражения нервной ткани», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни

Актуальность исследования.

Актуальность избранной темы определяется клинико-эпидемиологическими особенностями течения инфекции на современном этапе: на фоне снижения уровня общей заболеваемости сифилисом увеличивается удельный вес больных скрытыми и висцеральными формами сифилиса, а также имеющих специфическое поражение нервной системы.

Сложившаяся ситуация требует от клиницистов настороженности в отношении нейросифилиса, особенно учитывая определенные сложности, возникающие при интерпретации результатов клинико-серологического исследования ликвора в соответствующих группах пациентов.

В настоящее время потребности практической медицины в отношении диагностики нейросифилиса обуславливают необходимость разработки не только скрининговых методов, но и других высокоинформативных тестов, пригодных для решения сложных диагностических ситуаций, что в совокупности и доказывает актуальность изучения данной проблемы.

Научная новизна и практическая значимость результатов исследования.

В диссертационном исследовании представлены новые данные, касающиеся концентрации интерлейкинов – 23, 12p40, а так же глиального фибриллярного кислого протеина (GFAP) в ликворе больных различными формами сифилиса, а именно: повышенной концентрация ИЛ-23, ИЛ-12p40 и глиального фибриллярного кислого протеина (GFAP) в ликворе у больных

нейросифилисом по сравнению с больными сифилисом без доказанного поражения нервной системы.

Определено, что больные сифилисом скрытым неуточненным как ранним или поздним имеют наиболее высокий риск возникновения нейросифилиса и, как следствие, требуют наиболее тщательного обследования и серологического контроля после лечения.

Предложена современная прогностическая модель поражения нервной системы при сифилисе на основании лабораторных данных (определение IL-23, IL12p40, GFAP, уровня белка и плеоцитоза в ликворе).

Результаты исследования имеют значение для практического здравоохранения: показано, что определение в ликворе концентрации цитокинов (IL-23, IL12p40) и GFAP может быть использовано в качестве дополнительного метода диагностики поражения ЦНС у больных сифилисом.

Оценка выводов, результатов, рекомендаций.

Сформулированные выводы диссертационного исследования логичны, статистически обоснованы и полностью соответствуют тексту диссертации. Цель сформулирована в соответствии с темой исследования. Задачи поставлены адекватно цели. Основные положения, выводы и практические рекомендации базируются на убедительных данных, их глубоком анализе и научно обоснованы.

Заключение.

Таким образом, диссертация Кравченко Елены Николаевны «Совершенствование методов диагностики нейросифилиса на основе определения в ликворе маркеров поражения нервной ткани» представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой содержится решение актуальной научной задачи по разработке дополнительных критериев диагностики нейросифилиса, что полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской

