

Отзыв на автореферат диссертации М. М. Агапова

“Патологоанатомическая и комплексная гистобактериоскопическая характеристика отдельных форм туберкулёза, в том числе в сочетании с ВИЧ-инфекцией» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.3.2. – патологическая анатомия.

Учитывая достаточно высокие значения основных эпидемических показателей заболеваемости и смертности, проблема туберкулезной инфекции была и остается до настоящего времени весьма актуальной. Заболевание имеет достаточно широкое распространение, однако наибольшее число случаев туберкулеза регистрируется в группе лиц с грубой иммунной супрессией, обусловленной различными причинами, в том числе ВИЧ-инфекцией, этот факт и положен в основу научного исследования соискателя. Вне всяких сомнений следует согласиться, что и в настоящее время имеются определенные трудности этиологической верификации туберкулезного процесса в практике врача-патологоанатома, особенно это касается случаев исследований операционного и биопсийного материала, поскольку характер структурных изменений при туберкулезе у больных ВИЧ-инфекцией далек от классических морфологических проявлений, которые более 100 лет назад были описаны в литературе, а если учесть, что диагностическая окраска по Цилю-Нельсену, во многих случаях оказывается отрицательной, то становится очевидным, что необходимы дополнительные, более совершенные методы детекции микобактерий в тканях, на что указывает автор исследования. С этой точки зрения опыт соискателя, в отношении применения флюоресцентного метода и метода ИГХ, наряду с классической окраской для выявления КУБ, достаточно интересен и полезен, поскольку результатом такого исследования в сложных случаях является четкая этиологическая верификация туберкулезного процесса.

Интересными, с точки зрения патогенеза, являются данные о значительном полиморфизме МБТ, что требует дальнейших исследований. Этот факт был отмечен и в более ранних работах, в том числе В.А. Цинзерлинга и В.В. Свистунова, но впервые подробно охарактеризован автором с использованием морфометрии. Изучение этого феномена может внести изменения в схему патогенеза этого заболевания. Не исключено, что наличие кокковидных форм МБ может быть связано не только с применением лекарственной терапии, но и с изменением их свойств при персистенции у больных.

По материалам диссертации имеется достаточное количество публикаций, в том числе две в ведущем отечественном патологоанатомическом журнале «Архив патологии».

Исследование М.М. Агапова соответствует требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а сам соискатель достоин присвоения учёной степени.

Заведующий кафедрой патологической
анатомии ФБГОУ ВО «ИГМУ»
кандидат медицинских наук, доцент

В.В. Свистунов.

664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1
тел.: 8(3952)22-47-07
e-mail: vvsvistunov@gmail.com

