

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о соискателе Зориной Марине Михайловне, представившей диссертацию на тему «Латентная туберкулезная инфекция у сотрудников противотуберкулезной медицинской организации: диагностика, факторы риска, профилактика» по специальности 14.01.16 – фтизиатрия (медицинские науки) на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Зорина Марина Михайловна, 1963 года рождения. Окончила Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт в 1989 году по специальности «педиатрия». С 2007 года работает заведующим отделением эпидемиологии врачом-эпидемиологом в Новосибирском научно-исследовательском институте туберкулёза, занимается вопросами предупреждения заболеваемости туберкулёзом у медицинского персонала. С 2011 по 2014 годы обучалась в очной аспирантуре по специальности «фтизиатрия» и работала над проблемой диагностики, частоты и профилактики латентной туберкулёзной инфекции у сотрудников противотуберкулёзной медицинской организации. Побудительным мотивом для выбора темы настоящего исследования явилось широкое обсуждение в иностранной литературе проблемы латентной туберкулёзной инфекции, как резервуара активного заболевания туберкулёзом. Автор столкнулась со значительными различиями в понимании сущности латентной туберкулёзной инфекции во фтизиатрической среде, а также с недостаточной изученностью её частоты у такой очевидной группы риска по заболеваемости туберкулёзом, как медицинские работники, имеющие частые производственные контакты с бактериовыделителями. М. М. Зорина оказалась пытливым исследователем, обратилась к данным специальной литературы и выяснила, что современные методы диагностики латентной туберкулёзной инфекции (диаскинтест, квантифероновый тест) для медицинских работников практически не применяются, сведения о факторах, способствующих активации туберкулёза, отсутствуют, меры профилактики требуют пересмотра. В процессе работы диссертант показала себя грамотным вдумчивым исследователем, разработала и внедрила в практику работы методику выявления латентной туберкулёзной инфекции у сотрудников противотуберкулёзной медицинской

